

Por favor, lea detenidamente estas instrucciones de uso porque contienen información importante para usted, que debe tener en cuenta antes de utilizar este producto. Si no está seguro o tiene alguna otra duda, pregunte a su médico o farmacéutico.

DULCOGAS[®] es un producto sanitario que proporciona un alivio rápido de los trastornos gastrointestinales ocasionados por el exceso de gases.

Conserve este folleto ya que puede tener que volver a leerlo.

En este folleto:

1. ¿Qué es DULCOGAS[®] y para qué se utiliza?
2. Antes de tomar DULCOGAS[®]
3. Cómo tomar DULCOGAS[®]
4. Posibles efectos secundarios
5. Cómo conservar DULCOGAS[®]
6. Información adicional

1. ¿Qué es DULCOGAS[®] y para qué se utiliza?

El principal ingrediente de DULCOGAS[®] es la simeticona, un antiespumante que dispersa el gas retenido en el estómago e intestinos.

DULCOGAS[®] se utiliza:

- para el alivio del exceso de gases en el tracto gastrointestinal,
- para el alivio y el tratamiento sintomático de las molestias gastrointestinales como la flatulencia, eructos y meteorismo (ventosidades) o plenitud abdominal, sensación prematura de saciedad;
- en la preparación de exploraciones diagnósticas del área abdominal, p. ej., endoscopias, radiografías y ecografías.

2. Antes de utilizar DULCOGAS[®]

No tome DULCOGAS[®] si es alérgico (hipersensible) a la simeticona o a cualquiera de los demás componentes de DULCOGAS[®].

Este producto contiene sorbitol. Los pacientes con problemas hereditarios raros de intolerancia a la fructosa no deberían tomar este producto sanitario.

Este producto contiene aroma de menta. La inhalación puede producir disnea o ataques de asma.

Consulte siempre con su médico ante cualquier trastorno gástrico persistente e inexplicable.

Embarazo y lactancia

DULCOGAS[®] puede tomarse durante el embarazo o el periodo de lactancia, ya que atraviesa el estómago sin alterarse y no es absorbido por el organismo. Sin embargo, si está embarazada o en periodo de lactancia es aconsejable que consulte a su médico antes de tomar DULCOGAS[®].

Uso en niños

El producto no está destinado a niños menores de 6 años. Existen otras formas farmacéuticas para niños menores de 6 años.

Uso en diabéticos

DULCOGAS[®] es adecuado para diabéticos. Los gránulos no contienen azúcar.

Cada sobre contiene 0,08 BU (*bread unit*; unidad de pan).

(1 unidad de pan corresponde a 12 g de hidratos de carbono digeribles).

Toma de DULCOGAS[®] con otros productos:

No existen interacciones conocidas.

3. Cómo tomar DULCOGAS[®]

Tome siempre DULCOGAS[®] exactamente como se describe en este folleto.

Consulte con su médico o farmacéutico si tiene alguna duda.

- DULCOGAS[®] debe tomarse durante o después de las comidas y si es necesario, antes de acostarse.
- DULCOGAS[®] puede tomarse sin agua. Coloque los gránulos sobre la lengua. Se disolverán con la saliva y luego podrá tragarlos. Después puede beber un poco de agua, si lo desea.
- DULCOGAS[®] es un producto para ser utilizado a corto plazo y no debe tomarse más de 30 días sin consultar con su médico.

Dosis recomendada (a menos que su médico le haya prescrito otra distinta).

Edad	Dosis unitaria	Dosis diaria total
Adultos y adolescentes a partir de 14 años	1 a 2 sobres (que corresponden a 125-250 mg de simeticona)	6 sobres (que corresponden a 750 mg de simeticona)
Niños de 6 a 14 años	1 sobre (que corresponde a 125 mg de simeticona)	3 sobres (que corresponden a 375 mg de simeticona)

También pueden pedirle que tome DULCOGAS[®] en la preparación para exploraciones físicas diagnósticas de la región abdominal.

Dosis recomendada (a menos que su médico le haya prescrito otra distinta).

Edad	El día antes de la exploración	El día de la exploración
Adultos y adolescentes a partir de 6 años	2 a 3 sobres (que corresponden a 250-375 mg de simeticona)	1 sobre (que corresponde a 125 mg de simeticona)

Si toma una dosis mayor que la recomendada

La simeticona ejerce un efecto puramente físico en el tracto gastrointestinal. En caso de haber tomado una cantidad muy superior a la indicada, por lo general, normalmente la simeticona es tolerada sin dificultad.

Si olvida tomar DULCOGAS®

No tome una dosis doble de DULCOGAS® si olvidó de tomar la dosis anterior.

4. Posibles efectos secundarios

Aún no se conoce ningún efecto secundario derivado de la toma de DULCOGAS®.

Si observa algún efecto secundario, informe a su médico o farmacéutico.

5. Cómo conservar DULCOGAS®

Mantenga los productos sanitarios fuera del alcance de los niños.

No utilice DULCOGAS® después de la fecha de caducidad.

6. Información adicional

DULCOGAS® está disponible en envases de 18 sobres.

Cada sobre contiene 125 mg de simeticona.

Otros ingredientes:

Sorbitol, dióxido de silicio, carboximetilcelulosa de sodio y aroma de menta



Fabricante: HÄLSA Pharma GmbH
Maria-Goeppert-Strasse 5
D-23562 Lübeck- Alemania
Telf. +49 (0) 451290382 300
Fax. +49 (0) 451290382 320
Email: info@haelsa.com

Distribuido por: Boehringer Ingelheim España, S.A.

Fecha de información: Noviembre de 2012